

### 9. Op Reis

Landen en instellingen kunnen verschillende regels hebben ten aanzien van toediening van immunoglobulinen. Wij verzoeken u om de lokale en nationale richtlijnen te volgen.

#### Korte reizen over land

Zorg ervoor dat de patiënt weet dat hij/zij voldoende voorraad immunoglobuline en toedieningsmateriaal mee neemt op reis. Patiënt moet ervan op de hoogte zijn dat er temperatuurrestricties gelden met betrekking tot het bewaren van immunoglobuline producten.

#### Reizen naar het buitenland

Zorg ervoor dat de patiënt weet dat hij/zij voldoende voorraad immunoglobuline en benodigdheden en toedieningsmateriaal mee neemt op reis. Patiënt moet ervan op de hoogte zijn dat er temperatuurrestricties gelden met betrekking tot het bewaren van immunoglobuline producten.

Vertel patiënt dat hij/zij behalve een eigen reisverzekering ook een Europese verzekeringskaart (EHIC = European Health Insurance Card) nodig heeft. De patiënt heeft ook een medisch certificaat nodig waarin wordt vermeld dat het noodzakelijk is dat patiënt immunoglobuline en toedieningsmateriaal bij zich heeft, en ook een medisch certificaat voor de security en/of de douane.

Aangeraden wordt dat patiënt een internationale patiënten identificatiekaart bij zich heeft.

Deze documenten zijn op te vragen bij de verschillende bedrijven en infusie centra.

#### Reizen met het vliegtuig

Zorg ervoor dat de patiënt weet dat hij/zij de immunoglobuline niet in de ruimbagage pakt, maar mee neemt in de handbagage. De immunoglobuline zou kunnen bevriezen in het ruim en onwerkzaam worden. De patiënt heeft een medisch certificaat nodig waarin wordt vermeld dat het noodzakelijk is dat patiënt immunoglobuline en toedieningsmateriaal bij zich heeft, en ook een medisch certificaat voor de security en/of de douane. Vraag de patiënt om contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij en de luchthavenbeveiliging zodat alle vragen van te voren kunnen worden opgelost.

#### Immunoglobuline-toediening van te voren

Doseringen immunoglobuline kunnen van te voren worden toegediend: bij voorbeeld een patiënt die normaal gesproken wekelijks subcutane immunoglobuline krijgt (SCIG) en liever niet met toedieningsmateriaal wil reizen zou een dubbele immunoglobuline dosis toegediend kunnen krijgen voor aanvang van een reis van 2 weken. Vraag om advies en om ogelijkheden bij de voorschrijvende behandelaar

#### Een expert op het web!

De patiënt kan een Expert Immunoloog vinden op de website van Jeffrey Model Foundation (JMF) (<http://www.info4pi.org/>). Er zijn centra die hun patiënten voorzien van immunoglobuline die kan worden toegediend in het andere land. Volg de lokale richtlijnen.