

5. Hoe te handelen bij het optreden van ongewenste bijwerkingen bij behandeling thuis

De adviezen die in onderstaande tabel worden gegeven gelden voor IVIG EN SCIG behandelingen

Reactie	Graad	Interventies Thuis Maak altijd een aantekening in uw logboek als een ongewenste bijwerking is opgetreden
Niet-IgE-gemedieerde anafylaxie of anafylaxie (zeer zelden)		<ul style="list-style-type: none"> • Waarschuw direct de hulpdiensten • Noteer het batchnummer en informeer het infusie centrum
Koude rillingen/spierstijfheid	Mild	<ul style="list-style-type: none"> • Stop de infusie • Neem een pijnstiller • Noteer het batchnummer en informeer het infusie centrum
	Matig	<ul style="list-style-type: none"> • Stop de infusie • Neem een pijnstiller • Ga onmiddellijk naar uw arts of bel een ambulance • Noteer het batchnummer en informeer het infusie centrum • De volgende infusie moet in het infusie centrum plaatsvinden
	Ernstig	<ul style="list-style-type: none"> • Stop de infusie • Waarschuw direct de hulpdiensten • Noteer het batchnummer en informeer het infusie centrum • De volgende infusie moet in het infusie centrum plaatsvinden
Hoofdpijn	Mild	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat u voldoende vocht heeft ingenomen • Dien een pijnstiller toe indien nodig • Verlaag de infuussnelheid en gebruik een lagere infuussnelheid bij de volgende infusie LET OP: Drink meer water dan normaal in de 24 uur voorafgaand aan de volgende infusie
	Matig	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat u voldoende vocht heeft ingenomen op de dag van de infusie • Dien pijnstiller toe indien nodig • Stop de infusie

Europese Verpleegkundige Richtlijnen voor Toediening van Immunoglobulinen

		<ul style="list-style-type: none"> • Informeer het infusie-centrum • Ga direct naar uw arts
	Ernstig	<ul style="list-style-type: none"> • Stop de infusie • Waarschuw direct de hulpdiensten • Noteer het batchnummer en informeer het infusie centrum • De volgende infusie moet in het infusie centrum plaatsvinden
Urticaria/Galbulen	Matig	<ul style="list-style-type: none"> • Stop de infusie • Neem antihistaminica • Observeer de huiduitslag, neem foto's • Ga direct naar uw huisarts of waarschuw de hulpdiensten
	Ernstig	<ul style="list-style-type: none"> • Stop de infusie • Waarschuw direct de hulpdiensten • Noteer het batchnummer en informeer het infusie centrum • De volgende infusie moet in het infusie centrum plaatsvinden
Misselijkheid/Braken	Mild	<ul style="list-style-type: none"> • Observeer
	Matig	<ul style="list-style-type: none"> • Stop de infusie • Observeer • Bel het infusie centrum • Neem anti-emetica
	Ernstig	<ul style="list-style-type: none"> • Stop de infusie • Waarschuw direct de hulpdiensten • Noteer het batchnummer en informeer het infusie centrum • De volgende infusie moet in het infusie centrum plaatsvinden
Rugpijn	Mild	<ul style="list-style-type: none"> • Verlaag de infuussnelheid • Observeer • Gebruik een lagere infuussnelheid bij de volgende infusie
	Matig	<ul style="list-style-type: none"> • Stop de infusie • Informeer het infusie centrum • Ga direct naar uw arts
	Ernstig	<ul style="list-style-type: none"> • Stop de infusie

Europese Verpleegkundige Richtlijnen voor Toediening van Immunoglobulinen

		<ul style="list-style-type: none">• Waarschuw direct de hulpdiensten• Noteer het batchnummer en informeer het infusie centrum• De volgende infusie moet in het infusie centrum plaatsvinden
Lokale reacties bij SCIG (zwellings, roodheid, induratie, jeuk, branderig gevoel)	Mild	<ul style="list-style-type: none">• Observeer• Maak een foto van de reactie
	Matig	<ul style="list-style-type: none">• Observeer• Maak een foto van de reactie• Neem antihistaminica
	Ernstig	<ul style="list-style-type: none">• Stop het infuus• Neem antihistaminica• Waarschuw direct de hulpdiensten• Noteer het batchnummer en informeer het infusie centrum• De volgende infusie moet in het infusie centrum plaatsvinden