

Directrices Europeas de Enfermería para la Administración de Inmunoglobulinas

4. Tratamiento de los acontecimientos adversos sistémicos en el tratamiento dentro del hospital

Las recomendaciones que figuran en la tabla siguiente son válidas para los tratamientos de IGIV e IGSC.

Acontecimiento	Intensidad	Intervenciones de enfermería
Anafilaxia no mediada por la IgE o anafilaxia (muy infrecuente)		<ul style="list-style-type: none">• Seguir las directrices locales• Se puede prevenir esperando un par de días antes de la infusión si el paciente tiene fiebre o una infección aguda• Es preciso asegurarse de que el paciente conozca los signos de aparición de la anafilaxia
Escalofríos moderados/intensos	Leve	<ul style="list-style-type: none">• Ralentizar la infusión• Tomar la temperatura (escalofríos moderados) o la presión arterial y la temperatura (escalofríos intensos)• Administrar la medicación prescrita• Cuando los síntomas se hayan resuelto, reanudar la infusión con la velocidad más lenta
	Moderada	<ul style="list-style-type: none">• Detener la infusión• Tomar la temperatura (escalofríos moderados) o la presión arterial y la temperatura (escalofríos intensos)• Administrar la medicación prescrita• Cuando los síntomas se hayan resuelto, reanudar la infusión con la velocidad más lenta• Informar al médico
	Intensa	<ul style="list-style-type: none">• Detener la infusión• Seguir las directrices locales para los acontecimientos adversos graves y seguir los pasos recomendados para los escalofríos moderados/intensos
Cefalea	Leve	<ul style="list-style-type: none">• Informar al paciente de que esto puede suceder• Asegurarse de que el paciente esté debidamente hidratado• Administrar analgésico si es necesario

Directrices Europeas de Enfermería para la Administración de Inmunoglobulinas

		<ul style="list-style-type: none"> • Reducir la velocidad • Observar <p>NOTA: Advertir a los pacientes tratados con IGIV de que beban más agua de lo normal en las 24 horas anteriores a la infusión siguiente</p>
	Moderada	<ul style="list-style-type: none"> • Asegurarse de que los pacientes con tratamiento de IGIV estén debidamente hidratados en el día de la infusión • Administrar analgésico si es necesario • Reducir la velocidad • Llamar al médico
	Intensa	<ul style="list-style-type: none"> • Detener la infusión • Administrar analgésico • Llamar al médico • Si el paciente llama entre 24 y 72 horas más tarde con fotosensibilidad/fotofobia y rigidez de nuca, es preciso descartar la meningitis
Urticaria/ronchas	Moderada	<ul style="list-style-type: none"> • Informar al paciente de que esto puede suceder • Detener la infusión • Administrar antihistamínicos • Tomar la temperatura y la presión arterial para asegurarse de que este acontecimiento no supone la aparición de anafilaxia • Observar el exantema • Llamar al prescriptor • Reanudar la infusión a velocidades más lentas
	Intensa	<ul style="list-style-type: none"> • Detener la infusión • Administrar antihistamínicos • Llamar al médico • Tomar la temperatura y la presión arterial para asegurarse de que este acontecimiento no supone la aparición de anafilaxia
Náuseas/vómitos	Leve	<ul style="list-style-type: none"> • Informar al paciente de que esto puede suceder

Directrices Europeas de Enfermería para la Administración de Inmunoglobulinas

	Moderada	<ul style="list-style-type: none"> • Observar • Tener en cuenta que esto puede ser un principio de anafilaxia
	Intensa	<ul style="list-style-type: none"> • Detener la infusión • Observar • Administrar al paciente medicación antinauseosa • Tener en cuenta que esto puede ser un principio de anafilaxia
Dorsalgia	Leve	<ul style="list-style-type: none"> • Informar al paciente de que esto puede suceder • Observar • Tener en cuenta que esto puede ser un principio de anafilaxia
	Moderada	<ul style="list-style-type: none"> • Ralentizar o detener la infusión • Observar • Administrar analgésicos al paciente • Tener en cuenta que esto puede ser un principio de anafilaxia
	Intensa	<ul style="list-style-type: none"> • Detener la infusión • Administrar al paciente medicación antinauseosa • Llamar al médico • Tomar la temperatura y la presión arterial para asegurarse de que este acontecimiento no supone la aparición de anafilaxia
Reacciones locales con la IGSC (tumefacción, eritema, induración, prurito, quemazón)	Leve	<ul style="list-style-type: none"> • Informar al paciente de que esto es previsible durante las 8-10 primeras infusiones, pero que las reacciones locales irán disminuyendo • Observar y documentar
	Moderada	<ul style="list-style-type: none"> • Observar y documentar

Directrices Europeas de Enfermería para la Administración de Inmunoglobulinas

Intensa	<ul style="list-style-type: none">• Tal vez administrar antihistamínicos• Detener la infusión• Administrar antihistamínicos• Llamar al médico• Comprobar si hay alergias a los apósitos, a las soluciones de limpieza, al esparadrapo, al látex• Anotar el número de lote
---------	--

Tener en cuenta que se pueden dar episodios trombolíticos y neutrocitopenia al usar tratamientos de IGIV en grandes dosis o en pacientes inmóviles. Tratarlos de acuerdo con sus directrices locales.

Directrices Europeas de Enfermería para la Administración de Inmunoglobulinas

5. Tratamiento de los acontecimientos adversos en el tratamiento domiciliario

Las recomendaciones que figuran en la tabla siguiente son válidas para los tratamientos de IGIV e IGSC.

Reacción	Intensidad	Intervenciones domiciliarias Recordar anotar siempre los acontecimientos adversos en el libro de registro
Anafilaxia no mediada por la IgE o anafilaxia (muy infrecuente)		<ul style="list-style-type: none"> • Llamar a los servicios de urgencias de inmediato • Anotar el número de lote e informar a su centro de infusiones
Escalofríos moderados/intensos	Leve	<ul style="list-style-type: none"> • Detener la infusión • Tomar un analgésico • Anotar el número de lote e informar a su centro de infusiones
	Moderada	<ul style="list-style-type: none"> • Detener la infusión • Tomar un analgésico • Ir al médico o llamar a una ambulancia de inmediato • Anotar el número de lote e informar a su centro de infusiones • La infusión siguiente deberá realizarse en su centro de infusiones
	Intensa	<ul style="list-style-type: none"> • Detener la infusión • Llamar a los servicios de urgencias de inmediato • Anotar el número de lote e informar a su centro de infusiones • La infusión siguiente deberá realizarse en su centro de infusiones
Cefalea	Leve	<ul style="list-style-type: none"> • Asegurarse de estar debidamente hidratado • Administrar analgésico si es necesario • Reducir la velocidad y usar una velocidad más lenta en la infusión siguiente <p>NOTA: Beber más agua de lo normal en las 24 horas anteriores a la infusión siguiente</p>

Directrices Europeas de Enfermería para la Administración de Inmunoglobulinas

	Moderada	<ul style="list-style-type: none"> • Asegurarse de estar debidamente hidratado en el día de la infusión • Administrar analgésico si es necesario • Detener la infusión • Informar a su centro de infusiones • Ir al médico de inmediato
	Intensa	<ul style="list-style-type: none"> • Detener la infusión • Llamar a los servicios de urgencias de inmediato • Anotar el número de lote e informar a su centro de infusiones • La infusión siguiente deberá realizarse en su centro de infusiones
Urticaria/ronchas	Moderada	<ul style="list-style-type: none"> • Detener la infusión • Tomar antihistamínicos • Observar la erupción, realizar fotos • Ir al médico de cabecera de inmediato o acudir a los servicios de urgencias
	Intensa	<ul style="list-style-type: none"> • Detener la infusión • Llamar a los servicios de urgencias de inmediato • Anotar el número de lote e informar a su centro de infusiones • La infusión siguiente deberá realizarse en su centro de infusiones
Náuseas/vómitos	Leve	<ul style="list-style-type: none"> • Observar
	Moderada	<ul style="list-style-type: none"> • Detener la infusión • Observar • Llamar a su centro de infusiones • Tomar medicación para las náuseas
	Intensa	<ul style="list-style-type: none"> • Detener la infusión • Llamar a los servicios de urgencias de inmediato • Anotar el número de lote e informar a su centro de infusiones

Directrices Europeas de Enfermería para la Administración de Inmunoglobulinas

		<ul style="list-style-type: none"> • La infusión siguiente deberá realizarse en su centro de infusiones
Dorsalgia	Leve	<ul style="list-style-type: none"> • Ralentizar la infusión • Observar • Reducir la velocidad en la infusión siguiente
	Moderada	<ul style="list-style-type: none"> • Detener la infusión • Informar a su centro de infusiones • Ir al médico de inmediato
	Intensa	<ul style="list-style-type: none"> • Detener la infusión • Llamar a los servicios de urgencias de inmediato • Anotar el número de lote e informar a su centro de infusiones • La infusión siguiente deberá realizarse en su centro de infusiones
Reacciones locales con la IGSC (tumefacción, eritema, induración, prurito, quemazón)	Leve	<ul style="list-style-type: none"> • Observar • Realizar una foto de la reacción
	Moderada	<ul style="list-style-type: none"> • Observar • Realizar una foto de la reacción • Administrar antihistamínicos
	Intensa	<ul style="list-style-type: none"> • Detener la infusión • Tomar antihistamínicos • Llamar a los servicios de urgencias de inmediato • Anotar el número de lote e informar a su centro de infusiones • Su infusión siguiente deberá realizarse en el centro de infusiones