

Diretriz de enfermagem europeia para administração de imunoglobulina

4. Gestão de acontecimentos adversos sistémicos para tratamento hospitalar

As recomendações fornecidas na tabela abaixo são válidas para as terapias IVIG e SCIG.

Evento	Gravidade	Intervenções de enfermagem
Anafilaxia não mediada por IgE ou anafilaxia (muito rara)		<ul style="list-style-type: none">• Siga as suas diretrizes locais• Pode ser prevenido aguardando alguns dias antes da infusão, caso o doente apresente febre e/ou infeção aguda• Deve garantir que o doente conhece os sinais de início de anafilaxia
Calafrios	Ligeira	<ul style="list-style-type: none">• Abrande a infusão• Meça a temperatura (calafrios) ou pressão arterial e temperatura• Administre as medicações prescritas• Quando os sintomas desaparecerem, reinicie a infusão na taxa mais lenta
	Moderada	<ul style="list-style-type: none">• Pare a infusão• Meça a temperatura (calafrios) ou pressão arterial e temperatura• Administre as medicações prescritas• Quando os sintomas desaparecerem, reinicie a infusão na taxa mais lenta• Informe o médico
	Grave	<ul style="list-style-type: none">• Pare a infusão• Siga as diretrizes locais para eventos adversos graves e siga os passos recomendados para calafrios moderados
Cefaleias	Ligeira	<ul style="list-style-type: none">• Informe o doente de que esta situação pode acontecer• Certifique-se de que o doente está devidamente hidratado• Administre analgésico, se necessário• Reduza a taxa• Observe <p>NOTA: aconselhe os doentes com terapêutica IVIG a beber mais água do que o habitual nas 24 horas antes da próxima infusão</p>

Diretriz de enfermagem europeia para administração de imunoglobulina

	<p>Moderada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que os doentes com terapêutica IVIG estão devidamente hidratados no dia da infusão • Administre analgésico, se necessário • Reduza a taxa • Ligue para o médico <p>Grave</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pare a infusão • Administre analgésico • Ligue para o médico • Caso o doente ligue 24 a 72 horas mais tarde com fotossensibilidade/fotofobia e rigidez do pescoço, deverá excluir-se a meningite
Urticária	<p>Moderada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe o doente que esta situação poderá acontecer • Pare a infusão • Administrar anti-histamínicos • Meça a temperatura e pressão arterial para certificar-se de que este evento não é o início de anafilaxia • Observe a erupção cutânea • Ligue ao médico • Inicie novamente a infusão a taxas mais lentas <p>Grave</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pare a infusão • Administre anti-histamínicos • Ligue para o médico • Meça a temperatura e pressão arterial para certificar-se de que este evento não é o início de anafilaxia
Náuseas/Vómitos	<p>Ligeira</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe o doente de que esta situação pode acontecer • Observe • Esteja atento, sendo que poderá ser o início de anafilaxia <p>Moderada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pare a infusão • Observe

Diretriz de enfermagem europeia para administração de imunoglobulina

	Grave	<ul style="list-style-type: none"> • Dê ao doente a medicação para os enjoos • Esteja atento, sendo que poderá ser o início de anafilaxia • Pare a infusão • Dê ao doente a medicação para os enjoos • Ligue para o médico • Meça a temperatura e pressão arterial para certificar-se de que este evento não é o início de anafilaxia
Dores nas costas	Ligeira	<ul style="list-style-type: none"> • Informe o doente de que esta situação pode ocorrer • Observe • Esteja atento, sendo que poderá ser o início de anafilaxia
	Moderada	<ul style="list-style-type: none"> • Abrande ou pare a infusão • Observe • Dê analgésicos ao doente • Esteja atento, sendo que poderá ser o início de anafilaxia
	Grave	<ul style="list-style-type: none"> • Pare a infusão • Dê ao doente a medicação para os enjoos • Ligue para o médico • Meça a temperatura e pressão arterial para certificar-se de que este evento não é o início de anafilaxia
Reações locais em SCIG (inchaço, vermelhidão, tumefação, comichão, sensação de queimadura)	Ligeira	<ul style="list-style-type: none"> • Informe o doente de que esta situação é esperada durante as primeiras 8-10 infusões, mas as reações locais diminuirão • Observe e registre
	Moderada	<ul style="list-style-type: none"> • Observe e registre • Possivelmente, administrar anti-histamínicos
	Grave	<ul style="list-style-type: none"> • Pare a infusão • Administre anti-histamínicos • Ligue para o médico

Diretriz de enfermagem europeia para administração de imunoglobulina

- Verifique se existem alergias aos pensos, soluções de limpeza, fita adesiva, látex
- Registe o número de lote

Tenha em consideração que os eventos trombolíticos e neutropenia podem ocorrer quando a terapêutica IVIG é usada em grandes doses ou em doentes imobilizados. Faça a gestão de acordo com as suas diretrizes locais.

Diretriz de enfermagem europeia para administração de imunoglobulina

5. Gestão de eventos adversos para tratamento domiciliar

As recomendações fornecidas na tabela abaixo são válidas para terapias IVIG e SCIG.

Reação	Gravidade	Intervenções domiciliares Lembre-se sempre de registar no seu livro de registos após um evento adverso
Anafilaxia não mediada por IgE ou anafilaxia (muito rara)		<ul style="list-style-type: none">• Ligue imediatamente para os serviços de emergência• Registe o número de lote e informe o seu centro de infusão
Calafrios	Ligeiro	<ul style="list-style-type: none">• Pare a infusão• Tome um analgésico• Registe o número de lote e informe o seu centro de infusão
	Moderado	<ul style="list-style-type: none">• Pare a infusão• Tome um analgésico• Consulte imediatamente o seu médico ou ligue para uma ambulância• Registe o número de lote e informe o seu centro de infusão• A próxima infusão terá lugar no seu centro de infusão
	Grave	<ul style="list-style-type: none">• Pare a infusão• Ligue imediatamente para os serviços de emergência• Registe o número de lote e informe o seu centro de infusão• A próxima infusão terá lugar no seu centro de infusão
Cefaleias	Ligeiro	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que está devidamente hidratado• Administre analgésico, se necessário• Reduza a taxa e use uma taxa mais lenta durante a próxima infusão <p>NOTA: beba mais água do que o habitual nas 24 horas antes da próxima infusão</p>

Diretriz de enfermagem europeia para administração de imunoglobulina

	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que está devidamente hidratado no dia da infusão • Administre analgésico, se necessário • Pare a infusão • Informe o seu centro de infusão • Consulte imediatamente o seu médico
	Grave	<ul style="list-style-type: none"> • Pare a infusão • Ligue imediatamente para os serviços de emergência • Registe o número de lote e informe o seu centro de infusão • A próxima infusão terá lugar no seu centro de infusão
Urticária	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> • Pare a infusão • Tome anti-histamínicos • Observe a erupção cutânea, tire fotografias • Consulte imediatamente o seu médico de família ou procure os serviços de emergência
	Grave	<ul style="list-style-type: none"> • Pare a infusão • Ligue imediatamente para os serviços de emergência • Registe o número de lote e informe o seu centro de infusão • A próxima infusão terá lugar no seu centro de infusão
Náuseas/Vómitos	Ligeiro	<ul style="list-style-type: none"> • Observe
	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> • Pare a infusão • Observe • Ligue para o seu centro de infusão • Tome a medicação para os enjoos
	Grave	<ul style="list-style-type: none"> • Pare a infusão • Ligue imediatamente para os serviços de emergência • Registe o número de lote e informe o seu centro de infusão

Diretriz de enfermagem europeia para administração de imunoglobulina

		<ul style="list-style-type: none"> • A próxima infusão terá lugar no seu centro de infusão
Dores nas costas	Ligeiro	<ul style="list-style-type: none"> • Abrande a infusão • Observe • Reduza a taxa de infusão para a infusão seguinte
	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> • Pare a infusão • Informe o seu centro de infusão • Consulte imediatamente o seu médico
	Grave	<ul style="list-style-type: none"> • Pare a infusão • Ligue imediatamente para os serviços de emergência • Registe o número de lote e informe o seu centro de infusão • A próxima infusão terá lugar no seu centro de infusão
Reações locais na SCIG (inchaço, vermelhidão, tumefação, comichão, sensação de queimadura)	Ligeiro	<ul style="list-style-type: none"> • Observe • Tire uma fotografia da reação
	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> • Observe • Tire uma fotografia da reação • Administre anti-histamínicos
	Grave	<ul style="list-style-type: none"> • Pare a infusão • Tome anti-histamínicos • Ligue imediatamente para os serviços de emergência • Registe o número de lote e informe o seu centro de infusão • A sua próxima infusão terá lugar no seu centro de infusão